


























Clé simplifiée des ordres d'insectes les plus susceptibles d'être vus au jardin

Ordres

Zygentomères (<i>Thysanoures</i>) Poissons d'argents			Pas d'ailes. Antennes longues. Deux ou trois longs appendices au bout de l'addomen.
Éphéméroptères Éphémères ("mannes")			Ailes postérieures + petites, arrondies. Ailes dressées au repos. Longs appendices au bout de l'abdomen.
Odonates Libellules et demoiselles			Antennes courtes. Gros yeux. Deux paires d'ailes de taille similaire, ouvertes (libellules) ou fermées (demoiselles).
Plécoptères Perles			Ailes longues, étroites, sur celles du bas plus courtes et lobées. Souvent deux appendices à l'abdomen.
Dermaptères Perce-oreilles			Ailes très réduites sous des ailes antérieures courtes et cornées. Deux appendices en forme de pinces.
Orthoptères Sauterelles, criquets, grillons, blattes, mantes religieuses,			Ailes sup. longues et opaques. Pattes arrières fortes. Appendices abdominaux courts. Antennes courtes (criquets) ou longues (grillons, sauterelles). Broyeur.
Mécoptères Mouches-scorpion			Ailes généralement tachetées. Tête prolongée en un long 'bec'. Abdomen du mâle en 'queue de scorpion'.
Thysanoptères Thrips			Souvent difficiles à voir car très petits (- de 5 mm). Ailes frangées de soies.
Neuroptères Chrysopes, corydales,			Deux paires d'ailes assez semblables. Antennes longues et minces. Sans appendice abdominal.
Hémiptères sous-ordre Hétéroptères Punaises,			Ailes antérieures à pointe membraneuse et à base cornée. Parfois absentes ou discrètes. Piqueur-suceur
Hémiptères sous-ordre Homoptères Cigales, pucerons, cochenilles aleurodes, cercopes, etc			Ailes antérieures parfois translucides (cigale, puceron), souvent colorées, + ou- opaques. Piqueur-suceur
Lépidoptères Papillons, sésies			Ailes recouvertes de petites écailles. Pièces bucales (si présentes) en forme de trompe enroulée.
Diptères Moustiques, mouches, tipules			Une seule paire d'aile. La deuxième paire réduite à de petits balanciers. Gros yeux chez les mouches.
Coléoptères Scarabées, coccinelles, cassides, longicornes, charançons			Ailes antérieures (pas toujours sur toute la longueur de l'abdomen) cornées et opaques, cachant les ailes membraneuses dessous. Pièces bucales de type broyeur.
Hyménoptères Abeilles, guêpes, fourmis, tenthrèdes			Souvent une taille très fine. Deux paires d'ailes (si présentes), celles du haut plus grandes
Trichoptères Phryganes (caddisflies)			Ressemble aux papillons de nuit, sauf pour les ailes poilues et les très longues antennes. Étui larvaire.